

本說明書請與本藥品一併保管，供使用時詳細閱讀

衛署藥輸字第 022339 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

大幸止瀉糖衣錠

Seirogan Sugar Coated Tablets

引起腹瀉的主要原因通常是飲食上消化不良，攝食不良，水土不合，或腹部受冷等。腹瀉症狀持續的結果，維持體力所必需的營養份與水份的吸收就不能妥善運作，於是健康也會受到影響。

〔適應症〕

緩解輕微或中度急性腹瀉。

〔用法用量〕

年齡	一次量	一天服用次數
12歲以上	4 錠	3 次，餐後或需要時服用。 服用間隔應在 4 小時以上。
6歲以上未滿12歲	2 錠	

醫師藥師藥劑生指示藥品

PTP包裝

片劑的取出方法，如右圖指尖用力按下裝有片劑的 PTP 片的突出部，壓破背面的鋁箔，取出後服用。



〔成份含量〕

本藥每錠中含有以下的成份與含量

日本藥典	木蘭油 (Creosote)	22.5 mg
日本藥典	老鸛草末 (Powdered geranium herb)	25.0 mg
	黃柏乾燥浸膏 (Phellodendron bark dried extract)	25.0 mg

〔注意事項〕

1. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
2. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
3. 服用時請伴服適量清水，勿以乾吞方式服用以避免哽塞。

〔警語〕

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5g。
 - (2) 急性腹瀉不得使用超過 48 小時。
 - (3) 6 歲以下小孩、或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似疾患者不得自行使用。
2. 本藥含止瀉成分可能引起便秘。
3. 腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。
4. 不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。

〔保管與處理上的注意〕

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 請勿將其他藥物混入本藥。
4. 為避免誤用與保持品質切勿換裝到其他的容器。

〔包裝〕

24-1000 錠玻璃瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

服用本藥後，倘出現症狀變化，或有任何疑問，
敬請向購買藥局或藥商連絡詢問。

製造廠 Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. 藥商 大幸藥品股份有限公司
34-14 Uchihonmachi 3-chome 台北市中山北路2段9號6樓之2
Suita-city, Osaka, Japan 電話：02-2567-9604